

Si vous recevez cet e-mail en format texte, sans images, [cliquez ici](#)

## Centre Antipoisons NEWSLETTER

AVRIL 2014

[www.centreantipoisons.be](http://www.centreantipoisons.be)



### SAVIEZ-VOUS...

qu'un surdosage de paracétamol peut provoquer des lésions du foie?

### DANS CETTE NEWSLETTER

[Le paracétamol est-il un médicament sûr?](#)

[Les médicaments et le Centre Antipoisons en quelques chiffres.](#)



#### MÉDICAMENTS

## LE PARACÉTAMOL EST-IL UN MÉDICAMENT SÛR?

Le paracétamol est l'un des médicaments les plus utilisés au monde pour faire tomber la fièvre et traiter la douleur. Il est considéré comme un médicament relativement sûr, pouvant être administré aux enfants, aux personnes âgées et pendant la grossesse. Cependant, comme pour tous les médicaments, il est important de respecter les doses maximales.

### RESPECTEZ LES DOSES!

- Chez l'adulte, la dose maximale journalière est fixée à 4 grammes (4 comprimés de 1 gramme ou 8 comprimés de 500 mg).
- Chez l'enfant, il ne faut pas dépasser la dose de 10 à 15 mg /kg de poids corporel 4 fois par jour.

**Attention aux surdosages.** En cas de douleur intense, rage de dents ou violents maux de tête par exemple, la prise rapprochée de plusieurs

#### Centre Antipoisons

Hôpital Militaire Reine Astrid  
Rue Bruyn 1 - 1120 Bruxelles  
T +32 2 264 96 36  
F +32 2 264 96 46

[info@poisoncentre.be](mailto:info@poisoncentre.be)  
[www.centreantipoisons.be](http://www.centreantipoisons.be)

### LES MÉDICAMENTS ET LE CENTRE ANTIPOISONS

- Chaque année, le Centre Antipoisons reçoit environ 20.000

doses de paracétamol peut entraîner un surdosage. Chez l'enfant, des ingestions accidentelles de sirop à base de paracétamol peuvent survenir.

Veillez également à ne pas combiner plusieurs médicaments à base de paracétamol : le paracétamol est vendu sous différents noms commerciaux, vérifiez sur la notice ou l'emballage ce que contient le médicament.

## QUE FAIRE EN CAS DE SURDOSAGE?

Un surdosage en paracétamol peut provoquer des lésions graves et irréversibles du foie. Ces lésions peuvent être mortelles. Les symptômes d'intoxication n'apparaissent souvent qu'après 24 à 48 heures. Si vous suspectez un surdosage, il est important de contacter immédiatement un médecin ou le Centre Antipoisons. Si le surdosage est avéré, un antidote (acétylcystéine) doit être administré le plus rapidement possible en milieu hospitalier.

**Le paracétamol est et reste un antidouleur sûr. Il peut cependant provoquer de graves lésions du foie en cas de mauvais usage. Attention aux surdosages !**



- Le barbecue, source inattendue d'intoxication au CO.

appels concernant les médicaments.

- Les médicaments représentent 52% des produits en cause dans les appels.
- Plus de 6.000 appels concernent une erreur dans la prise ou l'administration d'un médicament.
- Un millier d'appels concernent les effets indésirables des médicaments.

Vous souhaitez voir apparaître un sujet particulier dans notre newsletter? Envoyez-nous un [e-mail](#). Nous essaierons, dans la mesure du possible, d'intégrer vos suggestions.

Pour toutes les questions urgentes concernant une intoxication, contactez notre **numéro gratuit 070 245 245**.

Connaissez-vous quelqu'un qui souhaiterait recevoir notre newsletter ? L'inscription est toujours possible via notre [site Internet](#).

Visitez notre site Web pour plus d'informations sur [www.centreantipoisons.be](http://www.centreantipoisons.be)

© 2014 Centre Antipoisons, Belgique

[Désinscription](#)